

Prélèvements sanguins pour prophylaxie en élevage porcin

Le dépistage Aujeszky est obligatoire dans les élevages plein air (y compris les engraisseurs et les élevages de sangliers) et les élevages de sélection et de multiplication. Les modalités pratiques pour les élevages porcins sont les suivantes.

Prélèvements sanguins : Elevage Plein air

Eleveage	Maladie	Nombre de reproducteurs à prélever	Nombre de porcs issus	Fréquence
<u>Naisseur</u>	<u>Aujeszky</u>	15 reproducteurs de différents rangs de portée (SUR BUVARDS) *	-	Annuelle
	S.D.R.P.	10% de reproducteurs de différents rangs de portée (SUR BUVARDS) avec un minimum de 15 et un maximum de 25 dont surtout des primipares*	-	Annuelle
<u>Naisseur - Engraisseur</u>	<u>Aujeszky</u>	15 reproducteurs de différents rangs de portée (SUR BUVARDS) *	-	Annuelle
	S.D.R.P.	10% de reproducteurs de différents rangs de portée (SUR BUVARDS) avec un minimum de 15 et un maximum de 25 dont surtout des primipares*	5 porcs issus dans les différents bâtiments ou salles* (SUR BUVARD)	Annuelle
<u>Engraisseur Post -sevreur</u>	<u>Aujeszky</u>	-	20 porcs charcutiers dans les différents lots ** (SUR BUVARD)	Annuelle
	S.D.R.P.	-	10 porcs charcutiers dans les différents lots** (SUR BUVARD)	Annuelle

* Cheptel entretenant moins de 15 reproducteurs :

Pour l'Aujeszky : Prélèver tous les reproducteurs

Pour le S.D.R.P. : Prélèver tous les reproducteurs + 5 porcs issus

** Cheptel entretenant moins de 20 porcs à l'engraissement :

Pour l'Aujeszky : Prélèver tous les porcs charcutiers

Pour le S.D.R.P. : Prélèver 10 animaux OU tous les porcs charcutiers si moins de 10

Prélèvements sanguins : Elevage Hors-sol

Elevage	Maladie	Nombre de reproducteurs à prélever	Nombre de porcs issus	Fréquence
<u>Sélectionneur</u> <u>Multiplicateurs</u>	<u>Aujeszky</u>	15 reproducteurs de différents rangs de portée (SUR BUVARDS) *	-	trimestrielle
	S.D.R.P.	10% de reproducteurs de différents rangs de portée (SUR BUVARDS) avec un minimum de 15 et un maximum de 25 dont surtout des primipares*	-	trimestrielle
<u>Naisseur</u>	<u>Aujeszky</u>	Aucun dépistage		
	S.D.R.P.	10% de reproducteurs de différents rangs de portée (SUR BUVARDS) avec un minimum de 15 et un maximum de 25 dont surtout des primipares*	-	Annuelle
<u>Naisseur - Engraisseeur</u>	<u>Aujeszky</u>	Aucun dépistage		
	S.D.R.P.	10% de reproducteurs de différents rangs de portée (SUR BUVARDS) avec un minimum de 15 et un maximum de 25 dont surtout des primipares*	5 porcs issus dans les différents bâtiments ou salles* (SUR BUVARD)	Annuelle
<u>Engraisseeur</u> <u>Post -sevreur</u>	<u>Aujeszky</u>	Aucun dépistage		
	S.D.R.P.	-	10 porcs charcutiers dans les différents lots** (SUR BUVARD)	Annuelle

* Cheptel entretenant moins de 15 reproducteurs :

Pour l'Aujeszky : Prélever tous les reproducteurs

Pour le S.D.R.P. : Prélever tous les reproducteurs plus 5 porcs issus

** Cheptel entretenant moins de 10 porcs à l'engraissement :

Pour le S.D.R.P. : Prélever tous les porcs charcutiers